

INSECTOS NUEVOS DE ESPAÑA

NEURÓPTEROS

Ascalaphus Cunii Sel. var. **Prati** Nav. (Ascaláfidos). *Miscellanea Prat de la Riba*, Barcelona 1923, p. 148.

A typo differt colore flavo alarum in album mutato.

Ala anterior. Media pars externa maculae flavae ultra divisionem cubiti vel paulo citerius pone rimum obliquum plus minusve lactea.

Ala posterior. Macula flava subtota lactea, parte basilari angusta juxta regionem nigram et in area costali duobus tertiis internis flavis.

Long. ♀	18 mm.
Ala ant.	23 —
— post.	20 —
Anten.	19 —

Patria. Sierra de Guara (Huesca).

Chrysopa prasina Burm. var. **gemina** Nav. (Crisópidos). *Arxius de l' Inst. de C.*, Barcelona, 1923, p. 8.

Caput viridi-flavum, sine stria rubra ante antennis, duobus punctis rubro-fuscis in occipite; antennis flavis, apicem versus fuscescentibus, primo articulo viridi immaculato.

Prothorax 3 punctis fuscis ad margines laterales distinctis; disco punctis fere in duas lineas longitudinales confluentibus. Mesonotum puncto fusco utrimque ad sulcum obliquum notatum.

Alae fere ut in var. *adspersa* Wesm. pictae; in tertio

apicali villosulæ; venulis gradatis vix fuscatis, fere 3/7 in ala anteriore, 2/5 in posteriore.

Long. corp.	9	mm.
— al. ant.	13'4	—
— — post.	12	—

Patria. Calatayud (Zaragoza), La Cueva (Soria).

PARANEURÓPTEROS

Platynemis latipes Ramb. var **brachygastra** Nav. (Agriónidos). Arxius de l' Inst. de C., Barcelona, 1923, p. 9.

A typo differt: statura multo minore.

Abdomine ala anteriore brevior; segmento tertio sesquilongiore secundo.

Long. corp. ♀	24	mm.
— al. ant.	18'5	—
— — post.	17	—
— abdom.	17'4	—

Patria. Marsá (Tarragona), 3 de Julio de 1922.

Cercion Lindeni Sel. var. **nigriceps** Nav. (Agriónidos).

Caput superne nigrum, lineis postocularibus penitus obsoletis.

Long. corp. ♂	33	mm.
— al. ant.	21	—
— — post.	19'4	—
— abdom.	26	—

Patria. Malagón (Ciudad Real), Mayo de 1922.
La Fuente leg.

Impreso el día 8 de Septiembre de 1923

INSECTOS NUEVOS DE ESPAÑA**PLECÓPTEROS**

Nemura striola a Nav. (Nemúridos). Arxius de l'Inst. de C., Barcelona, 1923, p. 14, f. 3.

Nigra, nitens.

Caput pubescentia grisea, tenui, brevi; epistomate margine antico fortiter convexo, fere semicirculari aut obtuso, pallidiore, leviter ferrugineo, labro antice truncato vel leviter concavo; oculis nigris, prominulis; ocellis nitidis, posterioribus magis inter se et ab anteriore quam ab oculo distantibus; palpis nigris; antennis nigris, nigro pilosis, articulo secundo transverso, ceteris elongatis.

Prothorax latior quam longior, capite angustior, pubescentia brevissima, grisea, retrorsum levissime angustatus. Mesonotum tuberculo laterali ad latus præscuti in modum vermiculi ferrugineo; pubescentia brevissima. Metanotum sublæve.

Abdomen nigrum.

Pedes fulvo-fusci, apice femorum et tibia rum et tarsis fuscescentibus; femoribus anterioribus supra ad medium et apice fuscis.

Alæ hyalinæ, irideæ, apice elliptice rotundatæ; reticulatione forti, fusca; costa usque ad venulam apicalem pallidiore; area apicai seu ultra venulam apicalem leviter fusco tincta.

Ala anterior membrana leviter fusco tincta, maxime juxta venas et ad anastomosim; fere 5 venulis procutibitalibus, 7 cubitalibus; striola sensibili, seu linea pallida ante et præter cubitum ad medium alæ, seu fere a basi ultra anastomosim.

Ala posterior fortiter iridea, pallidior, membrana levissime, vix sensibiliter fusco tincta sive infumata;

reticulatione tenuiore; venulis in γ fere in lineam positus.

Long. corp.	♀	5	mm.
"	al. ant.	9'7	"
"	— post.	8'3	"

Patria. Cabacés (Tarragona), 30 de Junio de 1922.

EFEMEROPTEROS

Ecdionurus diversus Nav. (Ecdionúridos).
Arxius de l'Inst. de C., Barcelona, 1923, p. 16, f. 4.

Caput fuscum; oculis in sico fusco-nigris; ocellis posterioribus pallidioribus, prominentibus, quasi tuberculo insitis; antennis fuscis, in medio apicali albidis.

Thorax superne et inferne piceus, nitens, ad latera fulvus.

Abdomen superne ferrugineum, margine postico segmentorum fusco; inferne pallidius, ferrugineo-fulvum; copulatore elongato, lobis ovalibus contiguis, fulvo-ferrugineo; urodiis fuscis, in tertio apicali albidis, fusco ad articulationes annulatis; cercis inferioribus fuscescentibus, apice fuscis.

Pedes anteriores ♂ totius fusci, tarsis vix pallidioribus, articulo primo triplo tibia brevioribus; pedibus mediis et posterioribus fulvis, fusco partim suffusis; tarsis fuscis.

Alæ hyalinæ, immaculatæ, irideæ, reticulatione fusca.

Ala anterior costa, subcosta et radio fulvo-rufis, apice obscurioribus; regione stigmatica lata fere 10 venulis rectis, aliquot ad costam aliis venulis intertextis, sive reticulatis vel furcatis.

Long. corp.	♂	7'5	mm.
—	al. ant.	8'7	—
—	— post.	3'3	—
—	urod.	17	—

Patria. Santa Eulalia (Barcelona), 14 de Julio de 1922.

SOCÓPTEROS

Marcenendius illustris Nav. (Mesopsócidos).
Arxius de l'Inst. de C., Barcelona, 1923, p. 11, f. 1.

Caput fulvum, pubescentia tenui brevique, fulvo-fusca; fronte lata, parum convexa; oculis in sicco nigris; ocellis nitidis, nigris, in triangulum valde obtusum dispositis, anteriore juxta clypeum, posterioribus juxta oculos; clypeo grandi, modice convexo, fuscescente; vertice sulco medio longitudinali tenui usque ad occiput signato; occipite postice truncato; palpis fulvis, fusco dense breviterque pilosis, longiusculis, articulo ultimo præcedente longiore, apice obtuso; antennis fulvis, fulvo-pilosis? (maxima pars deest).

Thorax fuscus, fusco pilosus, fulvo varius.

Abdomen subtotum fuscum, fusco pilosum, ovale.

Pedes fulvi, fusco pilosi; tibiis fuscis; tarsis longis, primo articulo sequentibus simul sumptis longiore, maxime in pedibus posterioribus.

Alæ apice elliptice rotundatæ, subacutæ.

Ala anterior tota squamis grandiusculis pilisque vestita reticulationem plerumque occultantibus; colore fusco, maculis aureis in disco et ad margines vario; venula radiali leviter obliqua, ultra ramum secundum sectoris radii inserta; sectore radii tribus ramis, primo seu interno simplice, sed venula marginali, margini perpendiculari, insignito, secundo (medio) bis furcato, tertio furcato, furca saltem duplo longiore suo pedunculo.

Ala posterior subacuta, hyalina, iridea, squamis destituta, pilis fuscis in tertio apicali; procubito ter furcato, furca apicali ramo anteriore multo brevior, posteriore paulo longiore suo pedunculo.

Long. corp. 2'3 mm.

— al. ant. 3'5 —

— — post. 2'6 —

Patria. Cabacés (Tarragona), 28 de Junio de 1922.

LEPIDOPTEROS

Zygæna fausta L. var. **læta** Nav. (Zigénidos).
 xius de l'Inst. de Cienc., Barcelona, 1923, p. 26.

Linea collaris seu transversa thoracis et lineæ laterales longitudinales ejusdem flavo-albæ seu albo-sordidæ.

Abdomen totum nigro-cæruleum, solum squamulis sparsis, oculo nudo haud visibilibus, purpureis.

Ala anterior fascia antemedia in duas maculas (seu puncta) soluta: anteriorem ad costam parvam, posteriorem orbicularem, a margine posteriore sat remotam.

Ala posterior fascia lata anteriore longitudinali usque ad fasciam nigram apicalem albescente.

Cetera ut in typo.

Long. corp.	10	mm.
al. ant.	15'5	—
— — post.	8'3	—

Patria. Marsá (Tarragona), 3 de Julio de 1922.

Impreso el 21 de Diciembre de 1923

Bibliography of the Neuropterida

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#):

764

Reference Citation:

Navás, L. 1923 [1923.??.??]. Insectos nuevos de España. Boletín de la Sociedad Entomologica de España 6:83-84, 113-116.

Copyrights:

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired.

Notes:

File:

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2006.